

FICHE PROGRAMME

Référence Programme ANDPC	10401800032
Titre du programme	Puberté du normal au pathologique
Catégorie professionnelle	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Médecine générale ➤ Pédiatrie
Orientations	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Médecin spécialisé en pédiatrie <ul style="list-style-type: none"> • Nouveautés en pédiatrie ➤ Médecin spécialisé en médecine générale <ul style="list-style-type: none"> • Suivi du développement de l'enfant, dépistage et prévention primaire.
Méthodes	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pédagogique ou cognitive : <ul style="list-style-type: none"> • Formation présentielle (congrès scientifique, séminaire, colloque, journée, atelier, formation interactive, formation universitaire...). ➤ Analyse des pratiques : <ul style="list-style-type: none"> • Groupe d'analyse de pratiques, staff des équipes médico-soignantes ou médico-techniques, pratiques réflexives sur situations réelles.
Mode d'exercice du participant	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Libéraux ➤ Salariés en centres de santé conventionnés ➤ Autres salariés (y compris hospitaliers)
Durée	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 1 Journée, soit 7 heures présentielles
Objectifs	<p>Objectifs généraux :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Identifier les pubertés précoces ou retardées. ➤ Analyser les courbes de croissances staturales. ➤ Orienter les examens complémentaires à bon escient. <p>Objectifs pédagogiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Caractériser les étapes du développement pubertaire normal, physique. ➤ Identifier une avance ou un retard pubertaire. ➤ Prescrire les examens complémentaires pertinents.
Pré requis	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Néant
Résumé	<p>Le médecin se doit de connaître le déroulement de la puberté normale et les différentes pathologies pouvant entraîner des retards ou avances pubertaires dont certaines causes doivent être traitées en urgence.</p> <p>Il est nécessaire de ne pas méconnaître les causes organiques, afin de ne pas retarder une prise en charge adaptée.</p> <p>Ces causes sont l'hypogonadisme hypogonadotrope et l'hypogonadisme hypergonadotrope. La cause la plus fréquente chez la fille est le syndrome de Turner.</p> <p>Il s'agit d'être capable d'établir le bon diagnostic (et d'y penser ni trop tard ni par excès) et de poser à bon escient les indications d'exploration et thérapeutiques.</p> <p>Ce séminaire s'adresse aux généralistes et aux pédiatres.</p>
Nombre d'étapes	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 1
Concepteur du programme	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dr Dominique GIRARDON
Nombre de participant maxi par session :	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 47