

# Repérage du risque suicidaire chez des patients présentant des troubles psychiatriques

**FORMATION PRESENTIELLE DE 7 HEURES, comprenant ateliers et plénières.**

**HORAIRES : Accueil 8H30, début 9H et fin 17H30**

**EXPERT : Pr Yann LE STRAT**

**LIEU : PARIS**

## Objectifs

### OBJECTIFS GENERAUX

- Etre en capacité de repérer une souffrance psychique et un risque suicidaire dans sa pratique quotidienne ;
- Maîtriser les outils d'évaluation de la crise suicidaire.

### OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET OPERATIONNELS

- Définir le concept de crise suicidaire ;
- Identifier les facteurs de risque de passage à l'acte ;
- Evaluer le degré d'urgence de la situation et de la crise suicidaire (repérage et évaluation du risque suicidaire) ;
- Identifier les outils pratiques et les techniques d'entretien utiles dans la prévention du suicide.

### **Public Visé**

Médecins généralistes et pédiatres

### **Pré Requis**

Médecin en exercice

## Méthodes et moyens pédagogiques

**FORMATION COGNITIVE PRESENTIELLE DE 7 HEURES, comprenant ateliers et plénières.**

**HORAIRES : Accueil 8H30, début 9H et fin 17H30**

## Qualification Intervenant(e)s

Pr Yann LE STRAT, psychiatre, PU-PH Université Paris Cité

## Parcours pédagogique

La France fait partie des pays européens les plus touchés par le suicide. En effet, en 2016, on comptait 9 300 décès par suicide en France métropolitaine. A ce chiffre s'ajoutent environ 200 000 tentatives de suicide par an donnant lieu à un contact avec le système de soins. Le suicide est la première cause de mortalité chez les 25-34 ans et la deuxième chez les 15-24 ans, après les accidents de la voie publique.

Les données de la littérature sur la prévention du suicide sont abondantes pour la prévention primaire et la prévention tertiaire mais pauvres pour la prévention secondaire. Cela tient au fait que les premières manifestations de la crise suicidaire sont difficiles à cerner : ses aspects sont très variables, les troubles sont parfois inapparents. Lorsqu'ils existent, ils se manifestent par des signes peu spécifiques et permettent peu de prévoir si la crise va évoluer vers une rémission spontanée ou vers une tentative de suicide ou d'autres passages à l'acte. Il n'y a pas un consensus international sur ses critères de définition.

Pourtant il est essentiel de repérer une telle crise suicidaire car elle justifie une prise en charge et constitue un moment fécond où une action thérapeutique est possible. La circulaire du 30 juillet 1992 définit l'urgence psychiatrique comme une demande dont la réponse ne peut être différée : il y a urgence à partir du moment où quelqu'un se pose la question, qu'il s'agisse du patient, de l'entourage ou du médecin : elle nécessite une réponse rapide et adéquate de l'équipe soignante afin d'atténuer le caractère aigu de la souffrance psychique.

Cette formation a pour objectif de permettre aux professionnels de santé, de savoir comment repérer puis réagir face à une urgence psychiatrique.

Voir les dates de sessions en bas de page du site

## Méthodes et modalités d'évaluation

Pré et Post Tests des connaissances acquises et délivrance d'une attestation de fin de formation

## Modalités d'Accessibilité

Accessible aux personnes en situation de handicap.

### Durée

**7.00** Heures  
**1** Jour

### Effectif

De 5 à 40 Personnes

### Tarifs (net de taxes)

**Inter (Par Stagiaire) : 665.00**  
**Intra (Par Jour) : Nous consulter**

<b>indemnisation Inter</b>
<b>315.00 €</b>

Exonération de la TVA, article 132i de la Directive TVA 2006/112/CE du 28 novembre 2006



Contactez-nous !

**SECRETARIAT MAFORM**  
Secrétariat

Tél. : 0972197661  
Mail : secretariat@maform.fr

Code DPC  
**10402325086**



M.A.FORM (Médical Association formation) - Numéro de déclaration d'activité (ne vaut pas agrément de l'état) : 11950368695

Version : SUIPR23-20250207